

FRONTLINE® Combo

Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

Une pipette de 0,5 ml contient: Substance s active s : Fipronil 50 mg. S -méthoprène 60,0 mg.

Excipient s : Butylhydroxyanisole E320 0,10 mg. Butylhydroxytoluène E321 0,05 mg.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

Une pipette de 0,67 ml contient: Substance s active s : Fipronil 67 mg. S -méthoprène 60,3 mg.

Excipient s : Butylhydroxyanisole E320 0,13 mg. Butylhydroxytoluène E321 0,07 mg.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

Une pipette de 1,34 ml contient: Substance s active s : Fipronil 134 mg. S -méthoprène 120,6 mg.

Butylhydroxyanisole E320 0,27 mg. Butylhydroxytoluène E321 0,13 mg.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L

Une pipette de 2,68 ml contient: Substance s active s : Fipronil 268 mg. S -méthoprène 241,2 mg.

Butylhydroxyanisole E320 0,54 mg. Butylhydroxytoluène E321 0,27 mg. FRONTLINE Combo Spot-On

Chien XL

Une pipette de 4,02 ml contient: Substance s active s : Fipronil 402 mg. S -méthoprène 361,8 mg.

Butylhydroxyanisole E320 0,80 mg. Butylhydroxytoluène E321 0,40 mg.

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on. Solution claire ambrée.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeurs.

Chez les chiens

- Traitement de l'infestation par les puces *Ctenocephalides spp.* . L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application.

- Traitement de l'infestation par les tiques *Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus* . Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines.

- Traitement de l'infestation par les poux broyeurs *Trichodectes canis* . Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP* .

Chez les chats

Élimination des puces *Ctenocephalides spp.* .

L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application.

Élimination des tiques *Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus* . Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines.

Élimination des poux broyeurs *Felicola subrostratus* . Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces DAPP* .

Chez les furets :

- A utiliser contre les infestations par des puces seules ou des infestations mixtes par des puces et des tiques.

- Élimination des puces *Ctenocephalides spp.* . L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs activité ovicide et des larves et pupes activité larvicide issues des œufs pondus par les puces adultes.

- Élimination des tiques *Ixodes ricinus* . Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales pendant 4 semaines.

Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les furets de moins de 6 mois ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple : maladies systémiques, fièvre ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'étude, l'utilisation du produit n'est pas recommandée pour les espèces non cibles.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats ou les furets car cela peut conduire à un surdosage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament. Eviter le contact du contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau pure avec soin. Se laver les mains après utilisation.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Ne pas surdoser.

Chats

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation.

En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Chiens:

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Utilisation en cas de gravidité et ou de lactation et de ponte

Chiens

La spécialité peut être utilisée pendant la gestation et la lactation.

Chats

La spécialité peut être utilisée pendant la gestation et la lactation.

Pour les traitements durant la période de lactation, voir rubrique "Précautions particulières d'emploi chez les animaux"

Furets

Les études de laboratoire sur les chats n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes, foetotoxiques ou maternotoxiques. Chez le furet, l'innocuité de ce médicament vétérinaire n'a pas été testée durant la gestation et la lactation. L'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire.

Posologie

Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0,5 ml pour un chat. En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Furets : Une pipette de 0,5 ml par furet, soit une dose de 50 mg de fipronil et 60 mg de S -méthoprène par furet, en une application cutanée. L'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Chiens : la dose minimale recommandée est de 6,7 mg de fipronil et de 6 mg de S -méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée.

Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal 0,67 ml ,

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal 1,34 ml ,

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal 2,68 ml ,

Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal 4,02 ml .

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

FR/V/3168431 0/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

FR/V/7543476 4/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

FR/V/7565368 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:

FR/V/2879019 8/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

FR/V/8787746 7/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4,02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.
Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Date A.M.M. 23/01/03.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

FR/V/3168431 0/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0,5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

FR/V/7543476 4/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0,67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

FR/V/7565368 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1,34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:

FR/V/2879019 8/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2,68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

FR/V/8787746 7/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4,02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 4 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4,02 ml.