



ANSM - Mis à jour le : 30/04/2014

**Dénomination du médicament**

**CRISTAL ADULTES, suppositoire  
Glycérol**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

**Sommaire notice**

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que CRISTAL ADULTES, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CRISTAL ADULTES, suppositoire ?
3. Comment utiliser CRISTAL ADULTES, suppositoire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRISTAL ADULTES, suppositoire ?
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QUE CRISTAL ADULTES, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

**Classe pharmacothérapeutique**

AUTRES LAXATIFS

(A : Appareil digestif et métabolisme).

**Indications thérapeutiques**

Ce médicament est utilisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CRISTAL ADULTES, suppositoire ?**

### **Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Réservé à l'adulte.

### **Contre-indications**

**N'utilisez jamais CRISTAL ADULTES, suppositoire dans les cas suivants :**

- Allergie (hypersensibilité) au glycérol ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique « Informations supplémentaires ».

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

**Faites attention avec CRISTAL ADULTES, suppositoire :**

- Si vous avez une maladie des intestins appelée rectocolite hémorragique ;
  - Si vous souffrez au niveau de l'anus (fissure anale, crise hémorroïdaire).
- Dans ces situations, il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament.

### **Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

**Grossesse et allaitement**

En l'absence de données cliniques chez la femme enceinte ou allaitante, il est préférable de ne pas prendre ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER CRISTAL ADULTES, suppositoire ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

## **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

Voie rectale. Le suppositoire doit être introduit au niveau de l'anus.

Si besoin, le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

La dose habituelle est de 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle, à renouveler 1 fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit si vous êtes toujours constipé(e).

Le traitement de la constipation ne doit pas, en moyenne, dépasser 10 jours.

Vous ne devez pas utiliser ce médicament de manière prolongée sans avoir consulté votre médecin.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez utilisé plus de CRISTAL ADULTES, suppositoire que vous n'auriez dû :**

Vous pouvez avoir de la diarrhée. Dans ce cas, diminuez la dose ou arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous oubliez d'utiliser CRISTAL ADULTES, suppositoire :**

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée d'utiliser.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, CRISTAL ADULTES, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Sensation de brûlures anales ;
- Exceptionnellement rectites congestives (inflammations du rectum).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CRISTAL ADULTES, suppositoire ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage.

### **Conditions de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient CRISTAL ADULTES, suppositoire ?**

**La substance active est :**

Glycérol .....  
2,16 g

Pour un suppositoire de 3,6 g.

**Les autres composants sont :**

Gélatine, eau purifiée.

**Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est ce que CRISTAL ADULTES, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de suppositoires en boîte de 10, 25, 30 ou 50 suppositoires.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

***Titulaire***

**COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
PLACE LUCIEN AUVERT  
77020 MELUN CEDEX**

***Exploitant***

**COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
PLACE LUCIEN AUVERT  
77020 MELUN CEDEX**

***Fabricant***

**LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN  
20 RUE LOUIS-CHARLES VERNIN  
77190 DAMMARIE-LES-LYS**

ou

**COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
PLACE LUCIEN AUVERT  
77020 MELUN**

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## Date d'approbation de la notice

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

## AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

## Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

## Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

## Autres

### **CONSEILS / EDUCATION THERAPEUTIQUE**

#### **Constipation occasionnelle :**

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

#### **Constipation chronique (constipation de longue durée) :**

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits....),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.